

水産用ベネサール 使用上の注意の変更のお知らせ

2022 年 1 月



この度、「水産用ベネサール」（プラジクアンテル経口駆虫剤）につきまして、使用上の注意を変更いたしましたので、お知らせ申し上げます。

ご使用に際しましては、下記変更内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 変更内容（下線部が変更部分）

変更後	変更前
<p>【基本的事項】</p> <p>1. 守らなければならないこと （一般的注意） （中略）</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は、正しく使用しなければハダムシ（<i>Benedenia seriolae</i>）及び住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）の駆除効果が得られないおそれがあるので、<u>本剤の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。</u> （中略） <p>2. 使用に際して気を付けること （中略）</p> <p>（魚に関する注意）</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は必要量以上使用すると、本剤の味に起因する一過性の摂餌不良が認められることがあるため、魚体重 1kg 当たり 1 日量プラジクアンテルとして 150 mg の投与量を厳守し、摂餌不良が生じないように注意すること。 <u>本剤は住血吸虫卵に薬効はないため、本剤投与後においても鰓に住血吸虫卵が残ることがある。</u> 期待する駆除効果が得られないことや思わぬ副作用が発生するおそれがあるので、本剤には、他の薬剤を加えて使用しないこと。 <u>住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）駆除の効能及び効果は、0～1 歳魚の稚魚・幼魚を用いた試験結果に基づいたものであり、2 歳魚以上を対象とした試験は行っていない。</u> 	<p>【基本的事項】</p> <p>1. 守らなければならないこと （一般的注意） （中略）</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は、正しく使用しなければハダムシ（<i>Benedenia seriolae</i>）及び住血吸虫（<i>Cardicola opisthorchis</i>）の駆除効果が得られないおそれがあるので、<u>本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。</u> （中略） <p>2. 使用に際して気を付けること （中略）</p> <p>（魚に関する注意）</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は必要量以上使用すると、本剤の味に起因する一過性の摂餌不良が認められることがあるため、魚体重 1kg 当たり 1 日量プラジクアンテルとして 150 mg の投与量を厳守し、摂餌不良が生じないように注意すること。 期待する駆除効果が得られないことや思わぬ副作用が発生するおそれがあるので、本剤には、他の薬剤を加えて使用しないこと。

2. 変更理由

再審査結果に基づき、使用上の注意を変更いたしました。

以上