


元気!  
丈夫!



アミノ  
プラス・K!

飼料 牛用混合飼料

# アミノプラス<sup>®</sup>・K

「アミノプラス<sup>®</sup>・K」は 新生子牛の成長をサポートするために、  
不足しがちなアミノ酸をバランスよく配合しています。



# 新生子牛の成長促進に! アミノ酸強化による子牛の発育促進

新生子牛用アミノ酸混合飼料です。生後不足しがちなアミノ酸の補給により、子牛の成長をサポートします。

※本製品のアミノ酸組成は新生子牛の血中アミノ酸含量を参考に計算されています。

## アミノプラス・K 給与試験例


供試牛：黒毛和種新生子牛 ①人工哺乳(平均体重:24kg、雄10頭/群) ②自然哺乳(平均体重:24kg、雄5頭+雌5頭/群)

方法：出生から14日間、“アミノプラス・K”10g/頭を給与



結果：“アミノプラス・K”の給与により、哺乳形態に関わらず試験群のIGF-1濃度が有意に増加。

結論：子牛への“アミノプラス・K”の給与は新生子牛の成長を促進する可能性がある。

### 出生後14日間給与した場合の子牛の日間増体量



### 試験群および対照群の血中IGF-1濃度



(芝野ら、日本産業動物獣医学会、2013)

**給与方法** 代用乳に添加又は直接給与してください。出生後10g/日を30日間給与してください。

**含有する飼料添加物の名称** L-メチオニン、リジン、トリプトファン、L-アルギニン、グルタミン酸ナトリウム、タウリン、L-バリン、トレオニン、イソロイシン

**原材料名等** コーングルテンミール、コーンスターチ、飼料用酵母(パン酵母)、ケイ酸

**使用上の注意**

- 開封後は早めに使い切る。
- 飼料等に混合する際は、防護具(マスク、眼鏡、手袋等)を着用し、粉塵等を吸い込まないようにすること。
- 使用済みの容器は放置せず、地方公共団体条例等に従い適切に処分すること。

**保存方法**

- 高温・多湿・直射日光を避け、食品等と区別し、小児の手の届かない場所に保管すること。
- 開封後は保管場所に戻し、必ず袋口を輪ゴム等でしっかり締めておくこと。

**包装** 2kg(500gチャック付きアルミ袋×4袋/箱) ※計量スプーン付  
10kg(5kgアルミ袋×2袋/箱) ※計量スプーン付