




餌料性肝臓障害改善剤グルタチオン製剤

# 水産用アトモレート<sup>®</sup>散 S



## 特長 1

水産用アトモレート散Sは、グルタチオンを主成分とした経口投与剤で、ぶり等のスズキ目魚類の餌料性肝臓障害の改善に優れた効果を発揮します。

## 特長 2

市場ニーズにお応えすべく、水産用アトモレート散の姉妹品として高濃度製品と致しました。

水産用 **アトモレート<sup>®</sup> 散 S**

## 投 与 量

本品は1日量として0.2g/kgB.W.を投与してください。  
(水産用アトモレート散Sの投与量早見表をご参照ください。)

## 休 薬 期 間

設定なし

## 成 分 及 び 分 量

本品は1g中グルタチオン100mgを含有する。

## 効 能 又 は 効 果

スズキ目魚類(ぶり、まだい、まあじ、ティラピア、その他のスズキ目魚類):  
餌料性肝臓障害の改善

## 用 法 及 び 用 量

魚体重1kg当たり1日量グルタチオンとして下記の量を配合飼料等に混合した後、  
餌料に均一に混ぜて投与する。  
スズキ目魚類(ぶり、まだい、まあじ、ティラピア、その他のスズキ目魚類):  
20mg…本品として0.2g

## 使 用 上 の 注 意

使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。  
指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上  
使用してください。

## 貯 蔵 方 法

室温保存

## 使 用 期 限

各製品の外箱・アルミ袋をご確認ください。

## 包 装

5kgダンボール箱  
(1kg×5袋アルミラミネート袋)

水産用アトモレート散Sの投与量早見表

総魚体重 (kg)	水産用アトモレート散S 1回投与量 (g)	1クール投与量	
		8日間 (kg)	14日間 (kg)
100	20	0.16	0.28
200	40	0.32	0.56
300	60	0.48	0.84
400	80	0.64	1.12
500	100	0.80	1.40
600	120	0.96	1.68
700	140	1.12	1.96
800	160	1.28	2.24
900	180	1.44	2.52
1000	200	1.60	2.80



製造販売元

あすかアニマルヘルス株式会社

東京都港区芝浦二丁目5番1号

TEL. 03-5439-4188 FAX. 03-5439-4191