

貯法 室温保存

犬用発情抑制剤

要指示医薬品 指定医薬品

ジースインプラント

GS IMPLANT

【本質の説明又は製造方法】

本剤は合成プロゲステロンであるクロルマジノン酢酸エステルをシリコンエラストマーと混合した徐放性製剤（インプラント剤）で、長期間血中濃度をほぼ一定に保つことのできる犬用発情抑制剤です。

また、本剤は摘出することにより1～8ヶ月後に発情が回帰し妊娠可能な状態に戻すことができます。

【成分及び分量】

品名	ジースインプラント
有効成分	日局クロルマジノン酢酸エステル
含量	1本500mg中100mg
外形	直径約4.4mm、長さ約28mmの円柱状で重さ約0.5g

【効能又は効果】

雌犬：発情抑制

【用法及び用量】

本剤をクロルマジノン酢酸エステルとして、下記の用量を無発情期に、頸部皮膚を外科的に切皮し、皮下に無菌的に移植する。通常10.0～20.0mg/kgを移植する。なお、移植期間を1年以内とする場合には5.0～10.0mg/kgを移植してもよい。

体重の目安による本剤の移植用量

体重	通常の場合	移植1年以内の場合
2.5～5kg	1/2本	1/4本
5～10kg	1本	1/2本
10～20kg	2本	1本
20～40kg	4本	2本
40～60kg	6本	3本

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

（一般的注意）

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

2. 使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

（犬に関する注意）

- ・本剤の投与前には健康状態について検査し、使用の可否を決めること。
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・本剤移植中、体重が増加することがある。
- ・本剤移植中、軽度の乳腺の発達を起こすことがある。
- ・本剤移植中、ときに脱毛を起こすことがある。
- ・本剤移植中、ときに子宮疾患を発生することがある。
- ・本剤移植中、軽度の外陰部の腫脹や外陰部からの漏出液がみられることがある。
- ・本剤移植中、移植部位の腫脹を起こすことがある。

（専門的事項）

①対象動物の使用制限等

- ・移植前に移植期間を設定し、移植途中で移植期間の延長をしないこと。移植期間を経過した本剤又は移植の目的を達した本剤は、必ず摘出すること。なお、移植期間は最長2年とすること。
- ・発情前期、発情期及び分娩直後の犬には、本剤の移植をしないこと。
- ・妊娠又は妊娠しているおそれのある犬には、本剤の移植をしないこと。
- ・性成熟前の幼犬には、本剤を移植しないこと。
- ・皮膚疾患、子宮疾患等のある犬には、本剤を移植しないこと。

②重要な基本的注意

- ・通常、高齢犬に子宮疾患の発生が多い傾向にあるので、高齢犬への移植の際には子宮の状態を観察するなど慎重に行うこと。
- ・本剤移植中、重篤な副作用が発生した場合は、直ちに摘出し経過を観察すること。
- ・本剤は脱落又は摘出後、1～8ヶ月で発情が回帰する。

【包装】

ジースインプラント：5本

【製品情報お問い合わせ先】

あすかアニマルヘルス株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦二丁目15番6号

TEL：03-5439-4188



製造販売元

あすかアニマルヘルス株式会社

東京都港区芝浦二丁目15番6号

TEL. 03-5439-4188 FAX. 03-5439-4191

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所（<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>）にも報告をお願いします。