

動物用医薬品

使用基準

プラジクアンテル経口駆虫剤  
水産用 **ベネサール**<sup>®</sup>



本剤は、プラジクアンテルを成分とする経口投与剤です。プラジクアンテルは速やかに吸収された後、体表粘液へ移行してスズキ目魚類に寄生するハダムシを体表から剥離、及び血中に移行し心臓に寄生する住血吸虫を死亡・消失させます。

成分・分量	1g中プラジクアンテル500mg
効能・効果	スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ ( <i>Benedenia seriolae</i> ) の駆除 クロマグロを含むスズキ目魚類の住血吸虫 ( <i>Cardicola opisthorchis</i> ) の駆除
用法・用量	魚体重1kg当たり1日量プラジクアンテルとして次の量を、水産用展着剤もしくは展着剤を含有した養魚用配合飼料と混合した後、餌料中に均一となるように添加し1日1回、3日間経口投与します。 スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ ( <i>Benedenia seriolae</i> ) の駆除：150mg (製剤として0.3g) クロマグロを含むスズキ目魚類の住血吸虫 ( <i>Cardicola opisthorchis</i> ) の駆除：15mg (製剤として0.03g)
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
使用禁止期間	スズキ目魚類：食用に供するために水揚げする前10日間
有効期間	5年 (包装に表示の使用期限内に使用してください。)
貯法	室温で保存してください。
包装	500g × 4 (アルミ袋)