

動物用医薬品

外傷、皮膚潰瘍治療剤



# 動物用イサロパン<sup>®</sup>

本剤は、患部に直接散布することにより、損傷皮膚組織の修復作用と分泌物の吸着による患部の乾燥化作用により、治癒を促進する外用散剤です。皮膚損傷部に対する刺激が少なく、創面への付着性に優れ、除去も容易な製剤です。

成分・分量	1g中アルクロキサ60mg
効能・効果	犬、猫の外傷、自潰瘍、手術創、皮膚炎に基づく皮膚のびらん・潰瘍
用法・用量	1日1～3回患部に適量を散布します。
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	4年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	室温で保存してください。
包装	25g × 6本（ポリエチレン容器）

動物用医薬品

指定医薬品

要指示医薬品

犬前立腺肥大症治療剤

ウロエース<sup>®</sup>錠

本剤は、抗アンドロゲン作用をもつ酢酸オサテロンを有効成分とする経口投与剤です。本剤は短期間投与（7日間）で肥大した前立腺を縮小させることにより、直腸や尿道の圧迫を解き、排尿障害や排便障害等の臨床症状を改善します。

成分・分量	1錠中酢酸オサテロン2.5mg
効能・効果	犬：前立腺肥大症
用法・用量	体重1kg当たり酢酸オサテロンとして、1回0.25～0.50mgを1日1回経口投与します。
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	気密容器で、室温で保存してください。
包装	50錠（10錠×5）

動物用医薬品

指定医薬品

要指示医薬品

劇薬



シクロスポリン製剤

# シクロスポリン動物用10mg・25mg・50mg「あすか」

本剤は、シクロスポリンを主成分とする免疫抑制剤です。

成分・分量	1カプセル中日局シクロスポリン10mg・25mg・50mg
効能・効果	犬：難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和
用法・用量	<p>1日1回体重1kg当たりシクロスポリン5mgを基準量として、下記の量を4週間連続経口投与します。</p> <p>なお、本剤は食餌から2時間以上あけて空腹時に投与し、投与後2時間は食餌を与えないでください。</p> <p>投与開始4週間以降に臨床症状の改善が認められた場合には、症状に応じて投与間隔を隔日又は週2回に漸減することができます。</p> <p>体重 2kg以上 3kg未満、10mgカプセルを1カプセル 体重 3kg以上 4kg未満、10mgカプセルを2カプセル 体重 4kg以上 8kg未満、25mgカプセルを1カプセル 体重 8kg以上15kg未満、50mgカプセルを1カプセル 体重15kg以上29kg未満、50mgカプセルを2カプセル 体重29kg以上36kg未満、50mgカプセルを3カプセル 体重36kg以上55kg未満、50mgカプセルを4カプセル</p>
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	気密容器で、室温で保存してください。
包装	シクロスポリン動物用10mg「あすか」：50カプセル（10カプセル×5） シクロスポリン動物用25mg「あすか」：50カプセル（10カプセル×5） シクロスポリン動物用50mg「あすか」：50カプセル（10カプセル×5）

動物用医薬品

指定医薬品

要指示医薬品

猫・抗甲状腺剤

**チロブロック錠 1.25mg・2.5mg**

販売元 住友ファーマアニマルヘルス株式会社

本剤は国内で初めて承認された猫の甲状腺機能亢進症治療薬で、有効成分はチアマゾールです。  
 本剤は甲状腺ホルモンの合成を阻害し、甲状腺機能亢進症に伴う諸症状を改善します。  
 有効成分の苦味をマスクするフィルムコート錠、分割せずに処方できる低含量錠（1.25mgと2.5mg）かつ飲みやすい小型錠（直径 5.6 mm）であり、猫にやさしい・猫のための製剤設計を実現しました。

成分・分量	1錠中日局チアマゾール1.25mg・2.5mg
効能・効果	猫の甲状腺機能亢進症
用法・用量	<p>本剤の初期投与量は、チアマゾールとして1.25mg/頭/回～2.5mg/頭/回とし、1日1回又は2回経口投与します。          初期投与量は、甲状腺機能亢進症と慢性腎臓病、心筋肥大、高血圧等の併発疾患を考慮して決定します。          投与開始前、投与開始から投与開始後3カ月までは2～4週毎、投与開始後3カ月以降は2～3カ月毎にモニタリング*を行ってください。</p> <p>モニタリングの結果を総合的に判断し、投与量を調節する場合には、1.25mg/頭/回又は2.5mg/頭/回で個体毎に適宜投与量を増減してください。*</p> <p>投与量の上限は、チアマゾールとして10mg/頭/回の1日2回とします。</p> <p>なお、本剤の投与を中止した場合、投与再開時の投与量は、チアマゾールとして1.25mg/頭/回～2.5mg/頭/回とし、1日1回又は1日2回経口投与します。</p> <p>*モニタリング：臨床症状、副作用の問診、身体検査、血清総T<sub>4</sub>の測定、血液学的検査、血液生化学的検査及び血液凝固検査          **投与量の指標：血清総T<sub>4</sub>が基準値の範囲（0.5～4.0 μg/dL）又は、甲状腺機能亢進症に伴う全身状態・身体検査での改善がみられた投与量</p>
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	遮光した気密容器で、室温で保存してください。
包装	チロブロック錠1.25mg：100錠（10錠×10） チロブロック錠2.5mg：100錠（10錠×10）

動物用医薬品

指定医薬品

犬・副腎皮質機能亢進症治療剤



要指示医薬品

# トリロスタン錠 2.5mg・5mg・10mg 「あすか」

有効成分のトリロスタンは、副腎皮質ステロイドホルモン合成酵素の一つである $3\beta$ -hydroxysteroid dehydrogenaseを阻害することにより、生体内の副腎皮質ホルモンの合成を抑制し、副腎皮質機能亢進症（クッシング症候群）に伴う諸症状を改善します。飲みやすい錠剤で、小型犬に対応した製剤設計です。また、フィルムコーティング錠で人への影響に配慮しています。

成分・分量

1錠中トリロスタン 2.5mg・5mg・10mg

効能・効果

犬の副腎皮質機能亢進症（クッシング症候群）に伴う諸症状の改善

用法・用量

本剤の投与は体重1.7kg以上の犬を対象とし、初期投与量（下記「初期投与量」参照）、減量、維持あるいは増量とも症状により適宜増減し（下記「初期投与終了以降」参照）、体重及び錠剤サイズに基づき、本剤の至適投与量を食餌と共に経口投与する。

## 1) 初期投与（投与開始後10～14日目まで）

初期投与量（2.2～6.7mg/kg）を1日1回、食餌と共に経口投与する。その際、各種錠剤サイズを組み合わせ、体重に基づき可能な限り低い投与量から開始する。

## 2) 初期投与終了以降

投与開始後10～14日目に、モニタリングとして生理学的検査、血液学的検査、血液生化学的検査及び臨床症状の観察を行うとともに、ACTH刺激試験\*）によりコルチゾールを測定する。その際、ACTH投与後のコルチゾールの値や臨床症状に基づいて、「投与量の増減基準」（表）を参考に、本剤の減量、維持あるいは増量を行い、至適投与量\*\*）を決定する。なお、至適投与量はモニタリングの結果を総合的に判断し、個体毎に適宜増減する。また、投与量の増減を行ってから10～14日目に経時的にモニタリングを行い、至適投与量に到達した後も約30日毎のモニタリングを行う。なお、コルチゾール及び臨床症状の改善がみられない場合は、1日の投与量を2回に分けて投与する方法（1日2回投与）で追加増量を行う。

## \*） ACTH刺激試験

- ①本剤の投与後4～6時間（できれば午前中）、試験前は安静、絶食、自由飲水とする。
- ②合成ACTH製剤の投与前の血液を採取する。
- ③合成ACTH製剤を0.25mg/頭の用量で静脈内（又は筋肉内）に投与する。ただし、5kg未満の小型犬では、0.125mg/頭とする。
- ④合成ACTH製剤の投与後1時間に血液を採取する。
- ⑤合成ACTH製剤の投与前及び投与後1時間の血液試料におけるコルチゾールを測定する。

## \*\*） 至適投与量の指標

ACTH刺激試験でのコルチゾールが $1.45\mu\text{g/dL}$ ～ $9.1\mu\text{g/dL}$ の範囲（基準値）、あるいは臨床症状の改善がみられた投与量。

## （表）投与量の増減基準

ACTH投与後のコルチゾールと臨床症状	投与量の減量、維持、増量
＜投与開始後2～4週まで＞	
< $1.45\mu\text{g/dL}$	減量
$1.45\sim 9.1\mu\text{g/dL}$	維持
> $9.1\mu\text{g/dL}$	増量
＜投与開始後4週以降＞	
< $1.45\mu\text{g/dL}$	減量
$1.45\sim 5.4\mu\text{g/dL}$	維持
> $5.4\sim 9.1\mu\text{g/dL}$ 臨床症状の改善:あり	維持
臨床症状の改善:なし	増量
> $9.1\mu\text{g/dL}$	増量

使用上の注意

添付文書等を参照してください。

有効期間

3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）

貯法

遮光した気密容器で、室温で保存してください。

包装

トリロスタン錠2.5mg「あすか」:100錠（10錠×10）  
 トリロスタン錠 5mg「あすか」:100錠（10錠×10）  
 トリロスタン錠 10mg「あすか」:100錠（10錠×10）

動物用医薬品

指定医薬品

犬糸状虫症予防剤



要指示医薬品

# ハートメクチン<sup>®</sup>錠 23・68・136

本剤は、抗寄生虫活性物質イベルメクチンを主成分とする犬糸状虫の寄生予防剤です。

成分・分量	1錠中イベルメクチン23 $\mu$ g・68 $\mu$ g・136 $\mu$ g
効能・効果	犬：犬糸状虫の寄生予防
用法・用量	毎月1回、1ヵ月間隔で体重1kg当たりイベルメクチンとして6~12 $\mu$ gを経口投与します。 投薬期間は、犬糸状虫感染開始後1ヵ月から感染終了後1ヵ月までとしてください。
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	4年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	気密容器で、室温で保存してください。
包装	ハートメクチン錠23：100錠（10錠×10） ハートメクチン錠68：100錠（10錠×10） ハートメクチン錠136：100錠（10錠×10）

## ハートメクチン<sup>®</sup>錠 投与早見表

体重 (Kg)	ハートメクチン錠														
	23	68	136		23	68	136		23	68	136		23	68	136
1.0	1/2			11.0		1		31.0		1	1	51.0		1	2
1.5	1/2			12.0			1	32.0		1	1	52.0		1	2
2.0	1			13.0			1	33.0		1	1	53.0		1	2
2.5	1			14.0			1	34.0			2	54.0		1	2
3.0	1			15.0			1	35.0			2	55.0		1	2
3.5	1			16.0			1	36.0			2	56.0			3
4.0	2			17.0			1	37.0			2	57.0			3
4.5	2			18.0			1	38.0			2	58.0			3
5.0	2			19.0			1	39.0			2	59.0			3
5.5	2			20.0			1	40.0			2	60.0			3
6.0		1		21.0			1	41.0			2	61.0			3
6.5		1		22.0	1		1	42.0			2	62.0			3
7.0		1		23.0	1		1	43.0			2	63.0			3
7.5		1		24.0	1		1	44.0			2	64.0			3
8.0		1		25.0	1		1	45.0	1		2	65.0			3
8.5		1		26.0		1	1	46.0	1		2	66.0			3
9.0		1		27.0		1	1	47.0	1		2	67.0			3
9.5		1		28.0		1	1	48.0	1		2	68.0	1		3
10.0		1		29.0		1	1	49.0		1	2	69.0	1		3
				30.0		1	1	50.0		1	2	70.0	1		3

動物用医薬品

指定医薬品

犬慢性心不全用持続性ACE阻害剤



要指示医薬品

# リズミナル<sup>®</sup>錠 1mg・2.5mg・5mg

本剤は、日局エナラプリルマレイン酸塩を主成分とする犬用アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤です。

成分・分量	1錠中日局エナラプリルマレイン酸塩1mg・2.5mg・5mg
効能・効果	犬：僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う症状の改善
用法・用量	体重1kg当たりエナラプリルマレイン酸塩として0.25～0.5mgを1日1回経口投与します。必要により体重1kg当たりエナラプリルマレイン酸塩として0.5mgを、1日2回に増量できます。
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	気密容器で、室温で保存してください。
包装	リズミナル錠1mg : 140錠（14錠×10） リズミナル錠2.5mg : 140錠（14錠×10） リズミナル錠5mg : 140錠（14錠×10）

犬用健康補助食品



# アシスハート<sup>®</sup> Q10 タブ

「アシスハート Q10」は、コエンザイム Q10 と心臓エキスを含む犬用健康補助食品です。

特 徴	補酵素コエンザイム Q10 は抗酸化作用とエネルギー産生作用を持ち、細胞の活性化・老化防止が期待されています。											
給与方法 ・ 給与量	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 犬の口に近づけ自然に食べさせるか、ペットフードに混ぜて与えてください。</li><li>・ 1日1回、体重 10kg 当たり 1 粒を食べさせてください。</li></ul>											
	給与量の目安 <table border="1"><thead><tr><th>体重</th><th>給与量</th></tr></thead><tbody><tr><td>～5kg</td><td>1/2粒</td></tr><tr><td>5～10kg</td><td>1粒</td></tr><tr><td>10～20kg</td><td>2粒</td></tr><tr><td>20～30kg</td><td>3粒</td></tr><tr><td>30kg～</td><td>4粒</td></tr></tbody></table>	体重	給与量	～5kg	1/2粒	5～10kg	1粒	10～20kg	2粒	20～30kg	3粒	30kg～
体重	給与量											
～5kg	1/2粒											
5～10kg	1粒											
10～20kg	2粒											
20～30kg	3粒											
30kg～	4粒											
賞味期限	3年(包装に表示の賞味期限内に使用してください。)											
保存上の注意	高温多湿、直射日光を避け乾燥したところに保管してください。											
包 装	1 瓶 60 粒入り(1 粒 0.2g 割線入り)											

犬・猫用健康補助食品



# グリーンマッスルGL「あすか」〈犬・猫用〉

グリーンマッスルGL「あすか」〈犬・猫用〉は、緑イ貝抽出成分を含む犬・猫用健康補助食品です。

特 徴	緑イ貝には、関節の健康を維持するグリコサミノグリカン、オメガ脂肪酸などがバランスよく含まれます。
給与方法・給与量	体重5kgごとに1～2粒を食べさせてください。
賞 味 期 限	3年（包装に表示の賞味期限内に使用してください。）
保存上の注意	開封後は速やかに使用し、高温多湿、直射日光を避け乾燥したところに保管してください。
包 装	90粒アルミ袋×10袋

犬・猫用シャンプー



# E&D<sup>®</sup>〈S〉 デオドラントシャンプー

低刺激性の植物派デオドラントシャンプーです。

特 徴	複数の洗浄成分をバランスよく配合し、洗浄力はそのままで低刺激性（弱酸性）のシャンプーとしました。 デオドラント成分（お茶の葉抽出物）を配合しています。 リンスと合わせて使用することでほのかなバラの香りが長続きます。
使用 方法	シャンプーをする前に本品を別の容器に取り分け、2～4倍（短毛種は2倍、長毛種は4倍を目安）に薄めてご使用ください。
保存上の注意	薄めたものは速やかにお使いください。開栓後は汚染（洗浄すぎ水や被毛などの混入）を避けて保管してください。
包 装	300mL × 1本 4L × 1缶

犬・猫用クリームリンス



**E&D**® 〈R〉 クリームリンス

コンディショニング効果の高い植物派リンスです。

特 徴	複数のエモリエント（保湿成分）を配合し、しっとりとした風合いに仕上げるリンスです。 弱酸性・低刺激性で、静電気による被毛のトラブル（パサツキ、毛玉など）を防ぎます。 デオドラントシャンプーと合わせて使用することで、ほのかなバラの香りが長続きします。
使用 方法	リンスをする前に本品を別の容器に取り分け、5～10倍（短毛種は5倍、長毛種は10倍を目安）に薄めてご使用ください。
保存上の注意	薄めたものは速やかにお使いください。開栓後は汚染（洗浄すぎ水や被毛などの混入）を避けて保管してください。
包 装	300mL × 1本 4L × 1缶