

動物用医薬品

指定医薬品

要指示医薬品

劇薬

使用基準

プロスタグランジンF_{2α}類縁体制剤レジプロン[®]-C

共済薬価収載品

本剤は、プロスタグランジンF_{2α}類縁体であるクロプロステノールを含有する水性注射液です。クロプロステノールは強力な黄体退行作用を有し、牛の発情周期中の黄体あるいは無発情の原因となる黄体を退行させることにより、発情を誘起します。

成分・分量	1mL中クロプロステノール0.250mg
効能・効果	牛：性周期の同調 黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治療
用法・用量	本剤は1頭当たり下記の量を筋肉内に注射します。 牛の性周期の同調 2mL（クロプロステノールとして0.50mg）を11日間隔で2回投与します。 なお、排卵後5～16日の黄体期にあたる牛に対しては2mL（クロプロステノールとして0.50mg）を1回投与します。 牛の黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治療 2mL（クロプロステノールとして0.50mg）を1回投与します。
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
使用禁止期間	牛：食用に供するためにと殺する前7日間
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	密封容器で、遮光して室温で保存してください。
包装	2mL × 10（アンプル） 10mL × 1（バイアル）