

動物用医薬品

指定医薬品

劇薬

消化器系機能異常改善剤



共済薬価収載品

使用基準

**テルペラン<sup>®</sup> 経口用**

本剤はメトクロプラミドを成分とする散剤です。メトクロプラミドは胃腸運動を調節する薬物として最も長い使用経験があり、機能の低下した消化管に対し、内容物の輸送を高めるように消化管運動機能を調節し、また、嘔吐を抑制します。

成分・分量	1g中日局メトクロプラミド15.35mg（塩酸メトクロプラミド換算20.00mg）
効能・効果	牛：第一胃食滞、単純性消化不良、胃炎、腸炎、第四胃変位、鼓脹症、その他疾患に伴う食欲不振
用法・用量	牛に対して、1日1～2回、1回量として体重1kg当たり、塩酸メトクロプラミドに換算して下記の量を水に懸濁又は飼料に混じて経口投与します。 第一胃食滞、単純性消化不良：0.1～0.4mg 胃炎、腸炎、第四胃変位、鼓脹症、その他疾患に伴う食欲不振：0.2～0.4mg 但し、重症例にあつては上記量の倍量まで増量できます。
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
使用禁止期間	牛：食用に供するためにと殺する前3日間又は搾乳する前72時間
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	気密容器で、室温で保存してください。
包装	500g（10g×50分包）